

PLAGUICIDA DE USO DOMESTICO

¡ALTO! LEA EL PANFLETO Y LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONOMICAS.

COMESA

RATUIK 0.5 SL

RODENTICIDA-COUMARINA
BROMADIOLONA

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: VITAMINA K
DENSIDAD: 1.516 mg/cm³ a 20°

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:

Este producto es un raticida anticoagulante de segunda generación, cuyo ingrediente activo es la BROMADIOLONA el cual elimina eficazmente ratas y ratones. Los roedores pueden consumir dosis letales en una sola ingestión, produciéndoles la muerte por hemorragias internas y anemia aguda después de 4 a 5 días del consumo, sin despertar recelo. Este producto es líquido y se usa para prepararlo a las dosis recomendadas. Contra ratas, coloque de 3 a 16 bloques de cebo por postura a intervalo de 15 a 30 pies lineales o echar unas 4 o 5 gotas en bebederos. Contra ratones, coloque 1 bloque por postura a intervalo de 8 a 12 pies lineales. Dos bloques de cebo pudieran ser necesarios en lugares de alta actividad de los ratones. Se aplica cuando se observa la presencia de los roedores o los daños causados por éstos. En ambos casos, debe mantenerse un suministro ininterrumpido de cebo fresco durante 10 a 15 días o hasta que hayan cesado los signos de actividad de los roedores. Recupere los restos de cebo deteriorado o contaminado, así como los animales muertos y destrúyalos quemándolos y/o enterrándolos, lejos de fuentes de agua. Puede mezclarse con cualquier tipo de alimento o echar algunas gotas del producto en bebederos. Debe ser colocado en lugares que se encuentren a lo largo de las paredes, cercanos a aberturas raídas, en esquinas o lugares ocultos, entre pisos y paredes, áreas cercanas a sus madrigueras y/o en los lugares donde se observe presencia de los roedores, tales como excrementos, pelos, huellas o manchas grasosas debidas al roer.

EQUIPO DE APLICACIÓN: se usa tal y como viene formulado. No se usan equipos de aplicación.



FORMA DE PREPARACIÓN DEL PRODUCTO: se usa tal y como viene formulado, puede mezclarse con cualquier tipo de alimento o echar algunas gotas del producto en bebederos. Use siempre equipo de protección personal para manejar este producto.



RECOMENDACIONES DE USO:

Debe ser colocado en lugares que se encuentren a lo largo de las paredes, cercanos a aberturas raídas, en esquinas o lugares ocultos, entre pisos y paredes, áreas cercanas a sus madrigueras y/o en los lugares donde se observe presencia de los roedores, tales como excrementos, pelos, huellas o manchas grasosas debidas al roer.

PLAGAS QUE CONTROLA

Nombre Común	Nombre Científico
Rata de tejado	<i>Rattus rattus</i> .
Rata Norway	<i>Rattus norvegicus</i>
Ratón casero	<i>Mus musculus</i>

DOSIS RECOMENDADA:

Diluya 5-7 cc por libras del atrayente que se vaya a usar. Para usarlo en bebedero diluya 3-7 cc/litros de agua.

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Puede repetirse tantas veces se presente la re infestación.

INTERVALO ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

No aplica.

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:

No se requiere.

FITOTOXICIDAD:

No aplica.

COMPATIBILIDAD:

No debe mezclarse con ningún producto.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacénese y transpórtese el producto en lugares frescos. Secos y aireados, lejos de alimentos, forrajes y medicamentos. Manténgalo en su envase original, bien cerrado y etiquetado.

PLAGUICIDA DE USO DOMESTICO

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION. MANTENGA BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCION AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACION DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACION: (GUANTES, BOTAS DE HULE, MASCARILLAS, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALON Y CAMISA DE MANGA LARGA, DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE).



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACION DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Reducción de la capacidad de coagulación de la sangre, que causa hemorragias nasales, encías sangrantes, hematomas, magulladuras extensas, dolores abdominales, sangre en las heces.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, dele a beber clara de huevo (8 para adultos, 4 para niños) con un poco de agua. Busque ayuda médica. No inducir al vómito.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga atención médica.

EN CASO DE INHALACIÓN: Traslade al paciente a un lugar no contaminado y aireado. Manténgalo en reposo. Busque ayuda médica

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese éstos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Obtenga atención médica.

NUNCA DÉ A BEBER, NI INDUZCA AL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO: El antídoto es Vitamina K. Adminístrela a dosis de: Adultos y mayores de 12 años, 15-25 mg/día (oral), 5-10 mg/día (SC-IM), 10-50 mg/día (IV); niños menores de 12 años, 5-10 mg/día (oral), 1-5 mg/día (SC-IM), 0.6 mg/kg/día (IV).

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

Hospital Dr. Luís E. Aybar. (Morgan).

TEL/684-3478/3672

Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello.

TEL/681-7828.

PROTECCION AL AMBIENTE:

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O PAQUETES VACÍOS.

RESPETE LAS AREAS DE PROTECCION DE RIOS, QUEBRADAS Y OTRAS AREAS FRAGILES.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMATICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTIA O DERIVA DEL PRODUCTO.

ASEGURESE QUE LAS AREAS DE PROTECCION DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCION (TALES COMO VEGETACION) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: Los envases vacíos deben pasar por el proceso de limpieza de "triple lavado, "perforelos y luego llévelos al centro de acopio más cercano a su localidad. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA: El fabricante únicamente garantiza la composición química y la calidad de este producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas condiciones.

FABRICADO Y/O FORMULADO POR:

SHENYANG AIWEI TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT CO., LTD

NO. XIHE EIGHT NORTH STREET, SHENYANG ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AREA, CHINA.

EXPORTADO POR:

UPI CROPSCIENCE CO., LTD

C-312 HI-TECH INFORMATION PLAZA, HUAYUAN, TIANJIN, 300384 P.R., CHINA

REGISTRADO E IMPORTADO POR:

COMERCIAL ESTEVEZ S.R.L. (COMESA)

📍 Ave. Riva, Jeremías, La Vega, República Dominicana

📞 809-573-7709 | ✉️ info@comesa.com.do

📱 [f](#) [@](#) [t](#) [i](#) [n](#) [o](#) @comesard

País	No. Registro
Rep. Dom.	8484