

ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.

CURZAKING 72 WP

FUNGICIDA- DITIOCARBAMATO + ACETAMIDA
CIOMOXANIL 8% + MANCOZEB 64%

PRECAUCION

ANTÍDOTO: NO TIENE

DENSIDAD: 1.32 at 25 °C (Cymoxanil)
1.92 Mancozeb

SOLVENTE: KAOLIN

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN: Se usa como fungicida en el control de infecciones fúngicas de la planta.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Se recomienda su aplicación usando equipos terrestres (manual, de tracción animal o mecánica) o equipo aéreo. El equipo a usar debe estar bien calibrado y sin derrames. Utilice boquillas de cono hueco. Después de ser usado, el equipo debe ser lavado cuidadosamente con agua y jabón.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua, agregue la dosis recomendada del producto y agite; termine de llenar con agua limpia el tanque del equipo de aplicación y mantenga la agitación incluso durante la aplicación. Prepare únicamente la solución que pueda ser aplicada durante el mismo día.



RECOMENDACIONES DE USO:

ENFERMEDADES QUE CONTROLA

NOMBRE DE LA PLAGA	
NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO
Mildiu algodonoso	<i>(Peronospora sp.)</i>
Mildiu polvoriento	<i>(Erysiphe sp.)</i>

CULTIVOS:

NOMBRE DEL CULTIVO	
NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO
Caña de azúcar	<i>(Saccharum officinarum)</i>
Tabaco	<i>(Nicotina tabacum)</i>
Papa	<i>(Solanum tuberosum L.)</i>
Mango	<i>(Mangifera indica)</i>
Aguacate	<i>(Persea americana)</i>
Cereza	<i>(Malpighia glabra)</i>
Piña	<i>Ananas comosu</i>

DOSIS RECOMENDADAS:

Se recomienda de 1.5-2.5 kg/ha en un volumen de agua de 400 Lts.

INTERVALO DE APLICACIÓN

Cuando aparezcan los primeros síntomas de ataque de las enfermedades.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

21 Días

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

48 Horas

FITOTOXICIDAD:

No es Fitotoxico si se aplica de acuerdo a las recomendaciones establecidas en el panfleto

COMPATIBILIDAD:

No es compatible con sustancias alcalina

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No se transporte ni almacene este producto junto a productos alimenticios, ropa o forrajes, no almacenar en casas de habitación. Guarde y transporte el producto en un lugar seco, ventilado, lejos de fertilizantes, semillas y otros productos agroquímicos o de uso humano o animal. Conserve el producto en su envase original bien cerrado.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, BEBER O FUMAR DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Náuseas, vomito, dolores de abdominales, irritación de la piel y los ojos, irritación del tracto respiratorio.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, dele a beber clara de huevo con un poco de agua (8 para adultos, 4 para niños). Busque ayuda médica.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga atención médica.

POR INHALACIÓN: Traslade al paciente a un lugar no contaminado y aireado. Manténgalo en reposo. Busque ayuda médica.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese éstos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Obtenga atención médica.

NUNCA DÉ A BEBER, NI INDUZCA AL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

El antídoto es sintomático y de soporte. No olvide notificar al Ministerio de Salud en caso de Intoxicación.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan).
TEL/684-3478/3672

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:



TÓXICO PARA PECES

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Los envases vacíos deben pasar por el proceso de limpieza de "triple lavado" y luego deben destruirse y enterrarse a una profundidad no menor de 40 cm, lejos de fuentes de agua y casas de habitación. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.

EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA: : La compañía fabricante y el registrante, así como el distribuidor garantizan el contenido de este envase original bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. Garantizamos el contenido del producto de acuerdo a lo estipulado en la etiqueta y el uso recomendado en el panfleto. El consumidor adquiere el producto con pleno conocimiento de ello.

FABRICANTE Y/O FORMULADOR:

Fabricante: SHANDONG A&FINE
AGROCHEMICALS CO., LTD (ADD:
DEVELOPMENT ZONE, SHOUGUANG, SHANDONG
PROVINCE, CHINA).

Exportador: SHENZHEN KING QUENSON
INDUSTRY CO., LTD (ROOM 1230 DIAOSUJIAYUAN,
ZHONGKANG ROAD, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN
P.R. CHINA)

**IMPORTADO Y/O REGISTRADO POR
COMESA SRL
Comercial Estevez**

**Av. Rivas con autopista Duarte, Sector Jeremías,
La Vega, Rep. Dom.**

PAÍS No. DE REG. FECHA DE REG.

CHINA

REP. DOM. 4151 28-11-2015

NUMERO DE LOTE: _____

FECHA DE FORMULACIÓN: _____

FECHA DE VENCIMIENTO: _____