

**! ALTO! LEA EL PANFLETO Y LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.**

# KIPER 38 WDG

FUNGICIDA – ANILIDE, FENILPIRAZOLES  
BOSCALID +PYRACLOSTROBIN



## ATENCIÓN ANTÍDOTO: NO TIENE

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.**

**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.  
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



### USO AGRONÓMICO

#### MODO DE ACCIÓN:

Fungicida de amplio espectro con actividad preventiva, curativa y traslaminar, para prevenir diversas enfermedades.

#### EQUIPO DE APLICACIÓN:

Se recomienda su aplicación usando equipos terrestres (manual, de tracción animal o mecánica) o aéreo. El equipo a usar debe estar bien calibrado y sin derrames. Utilice boquillas de cono hueco. Después de ser usado, el equipo debe ser lavado cuidadosamente con agua y jabón. Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua, agregue la dosis recomendada del producto y agite; termine de llenar con agua limpia el tanque del equipo de aplicación y mantenga la agitación incluso durante la aplicación. Prepare únicamente la solución que pueda ser aplicada durante el mismo día.



#### FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua, agregue la dosis recomendada del producto y agite; termine de llenar con agua limpia el tanque del

equipo de aplicación y mantenga la agitación incluso durante la aplicación.



#### RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	NOMBRE DE LA PLAGA		DOSIS kg/ha	P.C. (DIAS)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO		
Ajo	Alternaria	<i>Alternaria sp</i>	1 g de producto x	sin limite
Cebolla	Mancha purpura	<i>Alternaria sp</i>		sin limite
Papa	Alternaria	<i>Alternaria sp</i>	litro de agua o 0.8	sin limite
Melon	Mildiu	<i>pseudoperonospera cubensis</i>		sin limite
Tomate	Alternaria	<i>Alternaria sp</i>	kg/ha	sin limite
	Pudricion de la fruta	<i>Botrytis cinerea</i>		sin limite
	Oidio	<i>Leveillula taurica</i>		sin limite

P.C. (periodo de carencia)

#### INTERVALO DE APLICACIÓN:

Cuando aparezcan los primeros síntomas de enfermedad o 10 A 15 días.

#### INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Espere que el rocío de la aplicación haya secado, como mínimo 24 horas.

#### FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico usándolo a la dosis y forma de uso recomendado.

#### COMPATIBILIDAD:

Este producto es compatible con la mayoría de los agroquímicos comunes en el mercado, excepto los de reacción alcalina, como los caldos bórdeles. Se recomienda hacer pre-mezcla.

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

**ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:** Almacénesse y transpórtese el producto en lugares frescos. Secos y aireados, lejos de alimentos, forrajes y medicamentos. Manténgalo en su envase original, bien cerrado y etiquetado.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.**

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



**NO COMER, BEBER O FUMAR DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.**



#### SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Puede irritar los ojos, nariz, garganta y piel, nerviosismo.  
También diarrea, hipotermia, incoordinación muscular.

#### PRIMEROS AUXILIOS:

**POR INGESTIÓN:** Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, déle a beber clara de huevo (8 para adultos, 4 para niños) con un poco de agua. Busque ayuda médica. No inducir al vómito.

**POR CONTACTO CON LA PIEL:** Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga atención médica.

**POR INHALACIÓN:** Traslade al paciente a un lugar no contaminado y aireado. Manténgalo en reposo. Busque ayuda médica.

**POR CONTACTO CON LOS OJOS:** Lávese éstos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Obtenga atención médica.

**NUNCA DÉ A BEBER, NI INDUZCA AL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

**ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:**

No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de sostén.

**CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:**

Hospital Dr. Luís E. Aybar. (Morgan).

TEL/684-3478/3672

Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello.

TEL/681-2913/6922

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**



**TÓXICO PARA PECES**

**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.**

**MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:**

Los envases vacíos destrúyalos o perfórelos y luego llévelos al centro de acopio más cercano. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.

**EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

**AVISO DE GARANTÍA:**

El fabricante únicamente garantiza la composición química y la calidad de este producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas condiciones.

**FABRICANTE Y/O FORMULADOR:**

SHANDONG KANGQIAO BIO-TECHNOLOGY CO., LTD

**REGISTRADO E IMPORTADO POR:**

**COMERCIAL ESTEVEZ S.R.L. (COMESA)**

Ave. Riva, Jeremías, La Vega, República Dominicana

809-573-7709 | info@comesa.com.do

@comesard

**COMESA**

País	No. Registro
Rep. Dom.	5835