

¡ALTO! LEA EL PANFLETO Y LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.

PAREDON

72.2 SL

**FUNGICIDA-CARBAMATO
PROPAMOCARB CLORHIDRATO**

ATENCIÓN

**ANTÍDOTO: SULFATO DE ATROPINA
DENSIDAD: 1.09 g/ml a 20 °C**

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



USO AGRONÓMICO MODO DE ACCIÓN:

Fungicida sistémico con efecto protector. Después de su aplicación es absorbido por las raíces y por el cuello y transportado en sentido ascendente

EQUIPO DE APLICACIÓN:

El producto debe aplicarse con equipo de aspersión especializada. El personal que manipule este producto deberá usar equipo de protección: botas de hule, mascarilla, anteojos, guantes de hule, dosificador y aplicador. Calibre correctamente su equipo de aplicación inicialmente sólo con agua, verifique que el mismo se encuentre en buen estado de funcionamiento y sin fugas. Después de haber sido usados, el equipo y los utensilios utilizados deben ser cuidadosamente lavados con agua y jabón.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua, agregue la dosis recomendada del producto y agite; termine de llenar con agua limpia el tanque del equipo de aplicación y mantenga la agitación incluso durante la aplicación. Asegúrese de contar con el equipo auxiliar como

dosificadores, cubetas graduadas, paleta de agitación. Prepare únicamente la solución que pueda ser aplicada durante el mismo día. Después de ser usado, el equipo debe ser lavado cuidadosamente con agua y jabón. Debe usar guantes y botas de hule, mascarilla y lentes durante el lavado del equipo de aplicación.



RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	HONGOS A CONTROLAR Nombres Técnicos	DOSIS	Observaciones
Tratamiento del suelo en almácigo: tomate, pepino, pimiento, cebolla, tabaco, lechuga, flores, repollo, mango frutales en viveros.	Hongos de suelo (<i>phytophthora infestans</i> A1 y <i>p. cactorum</i> , <i>Phythium</i> spp., <i>Aphanomyces</i> spp.)	300cc/200 L de agua	Aplicar homogéneamente 2-4 litros de la solución por m ² . Repetir según la presión de la infección.
Tratamiento al trasplante dirigido al cuello de las plantas: tomate, pepino, pimiento, cebolla, tabaco, lechuga, flores, repollo, mango frutales en viveros.	Hongos de suelo (<i>phytophthora infestans</i> A1 y <i>p. cactorum</i> , <i>Phythium</i> spp., <i>Aphanomyces</i> spp.)	300-400 cc/200 L de agua	Aplicar dirigido al cuello de las plantas, 100cc de la solución al momento del trasplante. Repetir según la presión de infección.
Tratamiento por aspersión al follaje: tomate, pepino, pimiento, cebolla, tabaco, lechuga, flores, repollo, mango frutales en viveros.	Hongos del follaje (<i>phytophthora infestans</i> A1 y <i>P. cactorum</i> , <i>Peronospora manshurica</i> , <i>P. herbarum</i> , <i>P. chenopodii</i> , <i>P. farinosa</i> , <i>Bremia</i> sp)	2-3 L/ha	Usar concentraciones de 300-600 en un caldo de 200 litros de agua. Repetir según presión de la enfermedad.
Tratamiento mediante riego tecnificado: tomate, pepino, pimiento, cebolla, tabaco, lechuga, flores, repollo, mango, Piña, frutales en viveros.	Hongos de suelo (<i>phytophthora infestans</i> A1 y <i>p. cactorum</i> , <i>Phythium</i> spp., <i>Aphanomyces</i> spp.)	2-3 L/ha	Inyectar al sistema en el tercio medio del tiempo total de riego, diluir la dosis en 200 L de agua, agitar la solución y inyectar durante 1 hora de riego.

INTERVALO DE APLICACIÓN:

La aplicación se realiza al momento de la siembra o trasplante. Se puede realizar una aplicación en el semillero, otra después del trasplante y puede seguir la aplicación siempre que se presenten los síntomas.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Se puede reingresar al área luego que la mezcla de aspersión haya secado completamente. Si el acceso fuere necesario antes, use equipo de protección completo.

FITOTOXICIDAD:

Si se aplica a la dosis y recomendaciones dadas en el panfleto no existen problemas fitotóxicos.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas sin embargo antes de hacer la mezcla, realice previamente pruebas para comprobar

compatibilidad. No se recomienda mezclar con reguladores de crecimiento.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte ni almacene éste producto junto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No

mantenga los plaguicidas en contacto con otros agroquímicos fertilizantes, semillas. Almacene bajo llave en un lugar fresco y seco, aléjelo del calor o del fuego. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, BEBER O FUMAR DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Dolor de cabeza, náuseas, mareos, inquietud y ansiedad notorios. Espasmos musculares, debilidad, temblor, incoordinación, vómito, calambres abdominales y diarrea.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, déle a beber clara de huevo (8 para adultos, 4 para niños) en un poco de agua. Busque ayuda médica.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga atención médica.

POR INHALACIÓN: Traslade al paciente a un lugar no contaminado y aireado. Manténgalo en reposo. Busque ayuda médica.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese éstos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Obtenga atención médica.

NUNCA DÉ A BEBER, NI INDUZCA AL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

El antídoto es sulfato de atropina. Adminístrese por vía intravenosa o por inyección muscular si no es posible por la primera vía. La dosis es de 0.4 a 2.0 mg (adultos) y 0.05 mg/kg de peso corporal (niños menores de 12 años) repetidos cada 15 minutos hasta lograr la atropinización. Mantenga la atropinización mediante dosis repetidas durante un mínimo de 72 horas, según la gravedad del envenenamiento.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan).
TEL/684-3478/3672

Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello.
TEL/681-2913/6922

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:



TÓXICO PARA PECES

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Los envases vacíos deben pasar por el proceso de limpieza de "triple lavado", perfórelos y luego llévelos al centro de acopio más cercano a su localidad. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.



EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante únicamente garantiza la composición química y la calidad de este producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas condiciones.

FABRICADO Y/O FORMULADO POR:

YIFAN BIOTECHNOLOGY GROUP CO., LTD,

EXPORTADO POR:

SHENZHEN KING QUENSON INDUSTRY CO, LTD.

REGISTRADO E IMPORTADO POR

COMESA

@COMESARD    

País	Registro	
	Número	Fecha
Rep. Dom.	5836	20-11-2017