

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.

**PRIUD 40 ME**

**FUNGICIDA-TRIAZOL  
PROPICONAZOL+DIFENOCONAZOL**

# PRECAUCIÓN

**ANTÍDOTO: NO TIENE  
SOLVENTE: DIMETILBENCENO**

**DENSIDAD: 1.12 g/ml a 20°C**

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.  
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



## USO AGRONÓMICO

### MODO DE ACCIÓN:

Mezcla de Triazol, El difenoconazol fungicida sistémico, con efecto preventivo y curativo. Absorbido por las hojas, con translocación acropetala fuerte por el xilema. El Propiconazol es un fungicida con sistémia foliar, con efectos protector, curativo y erradicante.

### EQUIPO DE APLICACIÓN:

Se recomienda su aplicación al follaje usando equipos terrestres (manual, de tracción animal o mecánica) o equipo aéreo. El equipo a usar debe estar bien calibrado y sin derrames. Utilice boquillas de cono hueco. Antes de usar el equipo de aplicación, revise que esté en buen estado de funcionamiento y calibre con agua para verificar que está aplicando la dosis correcta. Utilice equipo de protección personal antes de usar y manipular este producto. Después de ser usados, el equipo de aplicación y los utensilios deben ser lavados cuidadosamente con agua y jabón.



### FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua, agregue la dosis recomendada del producto y agite; termine de llenar con agua limpia el tanque del equipo de aplicación y mantenga la agitación incluso durante la aplicación. Asegúrese de contar con el equipo auxiliar como dosificadores, cubetas graduadas y paleta de agitación. Prepare únicamente la solución que pueda ser aplicada durante el mismo día. Los utensilios y el equipo empleados en la mezcla y aplicación deben ser lavados con suficiente agua y jabón después de cada jornada de trabajo. Debe usar guantes y botas de hule, mascarilla y lentes durante el lavado del equipo de aplicación.



### RECOMENDACIONES DE USO:

### ENFERMEDADES QUE CONTROLA:

NOMBRE DE LA PLAGA	
NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO
Mancha de la vaina del arroz:	<u><i>Rhizoctonia oryzae</i></u>
Mancha marrón de la hoja:	<u><i>Helminthosporium oryzae</i></u>
Sigatoka amarilla.	<u><i>Mycosphaerella musicola</i></u>
Sigatoka negra.	<u><i>Mycosphaerella fijiensis</i></u>
Antracnosis:	<u><i>Colletotrichum spp.</i></u>
Tizón tardío:	<u><i>Phytophthora infestans</i></u>
Tizón temprano:	<u><i>Alternaria solani</i></u>
Tizón	<u><i>Pyricularia oryzae</i></u>
Tizon tardío	<u><i>Phytophthora infestans</i></u>
Mildiu vellosa	<u><i>Pseudoperonospora cubensis</i></u>

### CULTIVOS:

NOMBRE DEL CULTIVO	
NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO
Banano	<u><i>Musa sapientum</i></u>
Plátano	<u><i>Musa paradisiaca</i></u>
Arroz	<u><i>Oryza sativa</i></u>
Tomate	<u><i>Lycopersicum esculentum</i></u>
Papa	<u><i>Solanum tuberosum</i></u>
Mango	<u><i>Manguifera indica</i></u>
Café	<u><i>Coffea arabica</i></u>

### DOSIS RECOMENDADAS:

**Dosis:** Utilice 500-700 ml/ha.

### INTERVALO DE APLICACIÓN:

Aplique cuando aparezcan los primeros síntomas de las enfermedades o, preventivamente, cuando las condiciones ambientales favorezcan las posibilidades de infección.

**Frecuencia:** Repetir las aplicaciones cada dos semanas en arroz. En musáceas repetir cada 16 a 21 días, según las condiciones ambientales les sean favorables a la enfermedad.

**INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:**

30 días.

**INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:**

Puede reingresarse al área tratada después de que haya secado la aspersión sobre el cultivo.

**FITOTOXICIDAD:**

No es fitotóxico en los cultivos a las dosis recomendadas.

**COMPATIBILIDAD:**

Es compatible con la mayoría de los agroquímicos comúnmente usados. No obstante, se recomienda hacer pruebas de compatibilidad con pequeños volúmenes de mezcla.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:** Durante el manejo, mezcla, aplicación y lavado del equipo, use equipo de protección completo: sombrero gafas protectoras, mascarillas overol, guantes y botas de hule. Lave el equipo de aplicación y protección después de cada jornada. No lave la ropa de protección junto con la ropa de uso normal. Evite el contacto directo con el producto y respirar la llovizna de aspersión.

**ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:** No transporte ni almacene este producto junto con alimento, forrajes, medicamentos, ropas y utensilios de uso domésticos. No mantenga, este producto en contacto con otros agroquímicos, fertilizantes, semillas. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.  
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



**NO COMER, BEBER O FUMAR DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.**



**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:**

Dolor de cabeza, náuseas, vómito, confusión, ataxia, vértigo, debilidad, convulsiones y coma.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

**POR INGESTIÓN:** No induzca al vómito. Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, déle a beber clara de huevo (8 para adultos, 4 para niños) en un poco de agua. Busque ayuda médica.

**POR CONTACTO CON LA PIEL:** Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga atención médica.

**POR INHALACIÓN:** Traslade al paciente a un lugar no contaminado y aireado. Manténgalo en reposo. Busque ayuda médica.

**POR CONTACTO CON LOS OJOS:** Lávese éstos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Obtenga atención médica.

**NUNCA DÉ A BEBER, NI INDUZCA AL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

**ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:**

No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de sostén.

**CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:**

Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan).  
TEL/684-3478/3672

Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello.  
TEL/681-7828

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**



**TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS**

**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.**

**MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:**

Los envases vacíos deben pasar por el proceso de limpieza de "triple lavado", perfórelos y llévelos al centro de acopio más cercano a su localidad. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.

**EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

**AVISO DE GARANTÍA:**

El fabricante únicamente garantiza la composición química y la calidad de este producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas condiciones

**FABRICANTE Y/O FORMULADOR:**

**JIANGSU FENGSHAN GROUP CO., LTD.**  
WANGGANG TOWN, DAFENG CITY, JIANGSU PROVINCE,  
CHINA.

**EXPORTADO POR:**

**SHENZHEN KING QUENSON INDUSTRY CO., LTD.**

**REGISTRADO E IMPORTADO POR**

**COMERCIAL ESTEVEZ S. R. L**

AV. RIVAS, CON AUTOPISTA DUARTE, SECTOR JEREMIAS,  
LA VEGA  
REPUBLICA DOMINICANA

**PAÍS**            **No. DE REG.**    **FECHA DE REG.**

**CHINA**

**REP. DOM.**    **5259**                    **7/9/2016**