


! ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y  
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.



# **Terbuconaking** **40 SC**

**FUNGICIDA- BENZIMIDAZOL -TRIAZOL  
CARBENDAZIM-TEBUCONAZOL**

## PRECAUCION

**ANTÍDOTO: NO TIENE**

DENSIDAD: 1.02 g/ml ± 0.02 a 20 °C.

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE  
INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR  
EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE  
ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE  
INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y  
MEDICAMENTOS.



### USO AGRONÓMICO

#### MODO DE ACCIÓN:

Asociación de fungicida sistémico, de amplio espectro, con actividad preventiva, curativa y erradicante. Se absorbe rápidamente en el tejido verde de las plantas y se trasloca acropétalmente

#### EQUIPO DE APLICACIÓN:

Aplique con cualquier equipo de aspersión: bomba de mochila manual, de motor, equipo acoplado al tractor o con avión. Antes de aplicar verifique el estado de su equipo y calibre adecuadamente. Utilice boquillas cónicas procurando mojar el follaje. Recuerde lavar todos los utensilios usados en la aplicación.



#### FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua, agregue la dosis recomendada del producto y agite; termine de llenar con agua limpia el tanque del equipo de aplicación y mantenga la agitación incluso durante la aplicación. Si la aplicación es terrestre usar 200-400 litros de agua/ha, si es por avión 50-80 l/ha de agua.

#### RECOMENDACIONES DE USO:

NOMBRE DE LA PLAGA	
NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO
Tizón del arroz	<u><i>Pyricularia oryzae</i></u>
Escaldado de la hoja	<u><i>Rhynchosporium spp</i></u>
Mal del talluelo	<u><i>Rhizoctonia spp</i></u>
Mancha parda	<u><i>Helminthosporium oryzae</i></u>
Sarna	<u><i>Sphaceloma fawcetti</i></u>
Añublo pardo	<u><i>Cercopora vicosae</i></u>

#### CULTIVOS:

NOMBRE DEL CULTIVO	
NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO
Arroz	<u><i>Oryza sativa.</i></u>
Café	<u><i>Coffea arabica</i></u>
Yuca	<u><i>Manihot esculenta</i></u>
Ornamentales	
Lechosa	<u><i>Carica papaya</i></u>
Mango	<u><i>Manguifera indica</i></u>

#### DOSIS RECOMENDADAS:

En arroz, utilice de 400 cc por hectáreas.  
En los demás cultivos usar la dosis de 600 cc/ha.

#### INTERVALO DE APLICACIÓN:

En arroz se aplica como preventivo o a los 25-30 días de la germinación y luego se realiza otra en la época de embuchamiento, se puede realizar otra 20 días después de la segunda. En los demás cultivos 15-21 días después.

#### INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

21 días.

#### INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Espere que el rocío de la aplicación haya secado, como mínimo 24 horas.

#### FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico usándolo a la dosis y forma de uso recomendado.

#### COMPATIBILIDAD:

Este producto es compatible con la mayoría de los agroquímicos comunes en el mercado, excepto los de reacción alcalina, como los caldos bórdeles. Se recomienda hacer pre-mezcla.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:** Durante el manejo, mezcla, aplicación y lavado del equipo, use equipo de protección completo: sombrero gafas protectoras, mascarillas overol, guantes y botas de hule. Lave el equipo de aplicación y protección después de cada jornada. No lave la ropa de protección junto con la ropa de uso normal. Evite el contacto directo con el producto y respirar la llovizna de aspersión.

**ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:** No transporte ni almacene este producto junto con alimento, forrajes, medicamentos, ropas y utensilios de uso domésticos. No mantenga, este producto en contacto con otros agroquímicos, fertilizantes, semillas. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



**NO COMER, BEBER O FUMAR DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.**



**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:**

Puede irritar los ojos, nariz, garganta y piel, nerviosismo. También diarrea, hipotermia, incoordinación muscular.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

**POR INGESTIÓN:** Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, déle a beber clara de huevo (8 para adultos, 4 para niños) con un poco de agua. Busque ayuda médica. No inducir al vómito.

**POR CONTACTO CON LA PIEL:** Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga atención médica.

**POR INHALACIÓN:** Traslade al paciente a un lugar no contaminado y aireado. Manténgalo en reposo. Busque ayuda médica.

**POR CONTACTO CON LOS OJOS:** Lávese éstos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Obtenga atención médica.

**NUNCA DÉ A BEBER, NI INDUZCA AL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

**ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:**

No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de sostén.

**CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:**

Hospital Dr. Luís E. Aybar. (Morgan).  
TEL/684-3478/3672

Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello.  
TEL/681-7828

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**



**TÓXICO PARA PECES**

**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.**

**MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:**

Los envases vacíos deben pasar por el proceso de limpieza de "triple lavado", perfórelos y luego llévelos al centro de acopio más cercano. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.

**EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

**AVISO DE GARANTÍA:**

El fabricante únicamente garantiza la composición química y la calidad de este producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas condiciones.

**FABRICADO Y/O FORMULADO POR:**

JIANGSU SWORD AGROCHEMICALS, CO, LTD  
NO. 1008 GUANHUA EAST ROAD, JIANHU, JIANGSU, CHINA.

**EXPORTADO POR:**

GUANGDONG KEYWA CHEMICAL TRADING CENTER CO., LTD.  
CI-9, CI-10, CI-11-1, FOSHAN TORCH INNOVATION PARK, NO 13  
HUABAO NAN RD CHANCHENG DISTRICT, FOSHAN, GUANGDONG,  
CHINA

**REGISTRADO E IMPORTADO POR**  
COMERCIAL ESTEVEZ S.R.L. (COMESA)

@COMESASRL

**PAÍS**

**No. DE REG.**

**FECHA DE REG.**

REP. DOM

5457

2-3-2017

CHINA