

! ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.

BATIKING ULTRA 24 EC

HERBICIDA-OXIMA CICLODIONA CLETODIM

ANTÍDOTO: NO TIENE SOLVENTE: BENCENO

DENSIDAD: 1.15 A 20°C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN:

Herbicida selectivo de post emergencia, para gramíneas, y de muy bajo efecto sobre dicotiledóneas. Se absorbe rápidamente y se trasloca fácilmente desde las hojas tratadas al sistema radicular y puntos de crecimientos de las plantas.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Aplique con cualquier equipo de aspersión: bomba de mochila manual, de motor, equipo acoplado al tractor. Antes de aplicar verifique el estado de su equipo y calibre adecuadamente. Utilice boquillas cónicas procurando mojar el follaje. Recuerde siempre lavar todos los equipos usados en la aplicación.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua, agregue la dosis recomendada del producto y agite; termine de llenar con agua limpia el tanque del equipo de aplicación y mantenga la agitación incluso durante la aplicación. Use equipo de protección personal para manipular este producto.



RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	NOMBRE DE LA MALEZA		DOSIS kg/ha	Observaciones
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO		
Todos (Excepto Gramíneas y Cereales)	Avena loca	<i>Avena fatua</i>	Malezas Anuales : 250 cc/tanque de 200 litros	Malezas de 2-5 Hojas De 5-15 Cm de altura
	Avena silvestre	<i>Avena sativa</i>		
	Cadillo	<i>Cenchrus pauciflora</i>		
	Pasto bermuda	<i>Cynodon dactylon</i>		
	Pata de cotorra	<i>Digitaria spp</i>		
	Arrocillo	<i>Echinochloa spp</i>		
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>	Malezas Perennes: 500 cc/tanque de 200 litros	Malezas de 5-10 Hojas De 15-25 Cm de altura
	Arroz	<i>Oryza sativa</i>		
	Yerba de guinea	<i>Panicum maximum</i>		
	Paja peluda	<i>Rottboellia exaltata</i>		
	Cola de zorro	<i>Setaria spp</i>		
	Falso Jonson	<i>Sorghum spp</i>		
	Pasto azul	<i>Poa annua</i>		
	Yerba Amarga, Quinino, Bruca Amarga, Escoba de Bruja	<i>Parthenium hysterophorus</i>		

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Quando las malezas tengan al menos 3 hojas, la segunda aplicación 2-3 semanas después de la primera.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

30 días

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Espere que el rocío de la aplicación haya secado, como mínimo 24 horas.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico usándolo a la dosis y forma de uso recomendado.

COMPATIBILIDAD:

Es fitocompatible con la mayoría del producto usado en el mercado. Evitar la deriva a otros cultivos, no tiene efectos residuales.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacénesse y transpórtese el producto en lugares frescos. Secos y aireados, lejos de alimentos, forrajes y medicamentos. Manténgalo en su envase original, bien cerrado y etiquetado.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, BEBER O FUMAR DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Si se ingiere puede producir dermatitis, náuseas, dolor de cabeza, vómitos, diarrea, hiperexcitabilidad, palpitaciones, arritmia, ataxia, debilidad, daños en el hígado, ronquera.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN:

Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, déle a beber clara de huevo (8 para adultos, 4 para niños) con un poco de agua. Busque ayuda médica. No inducir al vómito.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga atención médica.

POR INHALACIÓN: Traslade al paciente a un lugar no contaminado y aireado. Manténgalo en reposo. Busque ayuda médica.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese éstos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Obtenga atención médica.

NUNCA DÉ A BEBER, NI INDUZCA AL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

No existe antídoto específico. Dar tratamiento sintomático y de sostén.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan).
TEL/684-3478/3672

Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello.
TEL/681-2913/6922

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:



TÓXICO PARA PECES

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES



TOXICO PARA ABEJAS

**MANEJO DE ENVASES VACÍOS.
EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:**

Los envases vacíos deben pasar por el proceso de limpieza de "triple lavado" perforélos y luego deben ser llevados al centro oficial de acopio más cercano. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.

EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante únicamente garantiza la composición química y la calidad de este producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas condiciones

REGISTRADO E IMPORTADO POR:

COMERCIAL ESTEVEZ S.R.L. (COMESA)

📍 Ave. Riva, Jeremías, La Vega, República Dominicana

☎ 809-573-7709 | ✉ info@comesa.com.do

📱 @comesard

COMESA

País	No. Registro
Rep. Dom.	7022