


**! ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.**

# PROPIKING 36 EC

HERBICIDA-ANILIDA  
PROPANIL

## DAÑINO



**ANTIDOTO: NO TIENE**  
**DENSIDAD: 1.41 (22°C)**  
**SOLVENTE: ACETONA**

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICION.**

**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACION. MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMESTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



### USO AGRONÓMICO

**MODO DE ACCIÓN:** Se usa como herbicida en control de malezas en el cultivo de arroz

**EQUIPO DE APLICACIÓN:** Se recomienda su aplicación en forma terrestre, ya sea con equipo manual (bombas de mochila), equipo impulsado por un tractor o en forma aérea. Utilice boquilla fina de cono.



**FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:** Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua, agregue la dosis recomendada del producto y termine de llenar el volumen del tanque de aplicación. El equipo de aplicación y los utensilios usados en la mezcla del producto deben ser lavados después de cada jornada de trabajo, por lo menos tres veces. Mantenga en agitación constante la mezcla dentro del tanque. Prepare únicamente la solución que pueda ser aplicada durante el mismo día. Utilice equipo de protección personal durante el manejo y uso de este producto.



### RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	NOMBRE DE LA MALEZA		DOSIS lt/ha	Observacion
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO		
Arroz (Oryza sativa)	Bledo Rojo	(Amaranthus retroflexus)	7.5 - 12.5	La dosis esta relacionada directamente con la etapa de las malezas y el cultivo. Consulte su tecnico COMESA
	Caperonia	(Caperonia catanæaeifolia)		
	Canizo	(Chenopodium album)		
	Pega Pega	(Desmodium tortuosum)		
	Lengua de gato	(Galium aparine)		
	Carvo de agua	(Jussiaea infifolia)		
	Erredadera	(Polygonum convolvulus)		
	Mostaza silvestre	(Brassica hirta)		
	Dormilona	(Mimosa pudica)		
	Frijolillo	(Phaseolus lathyroides)		
	Sanguinaria mayor	(Polygonum aviculare)		
	Verdolaga	(Portulaca oleracea)		
	Herba buena	(Richardia brasiliensis)		
	Mostaza blanca	(Sinapis alba)		
	Mostaza silvestre	(Sinapis arvensis)		
	Cadillo falso	(Xanthum occidentale)		
	Herba de lagarto	(Alternathera phloxeroides)		
	Rodilla de pollo	(Boerhaavia decumbens)		
	Bolsita de pastor	(Capsella bursa-pastoris)		
	Herba de cabra	(Croton capitatus)		
	Lechechilla	(Euphorbia heterophylla)		
	Bejuco	(Ipomoea congesta)		
	Lengua de vaca	(Rumex crispus)		
	Herba de pollo	(Commelina diffusa)		
	Balsamina	(Mamordica charantia)		
	Uchiva	(Physalis heterophylla)		
	Lantán	(Plantago major)		
	Viernes santo	(Phyllanthus niruri)		
	Pimientilla	(Polygonum persicaria)		
	<b>Malezas Gramíneas</b>			
Zacate de agua	(Echinochloa crusgalli)			
Paja mona	(Leptochloa filiformis)			
Para	(Panicum purpurascens)			
<b>Ciperáceas</b>				
Coyulillo	(Cyperus rotundus)			
Barba de indio	(Fimbristylis annua)			
Chula	(Cyperus ferax)			
Flecha	(Fynchospora corniculata)			

**INTERVALO DE APLICACIÓN:** Aplique cuando aparezcan los primeros síntomas de malezas, repita si es necesario cuando vuelvan a surgir nuevos brotes.

**INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:**  
**30días.**

**INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:**  
**24 horas.**

**FITOTOXICIDAD:** En los cultivos recomendados no es fitotóxico si es usado como se indica en el panfleto.

**COMPATIBILIDAD:** Es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos existentes en el mercado, exceptuando los materiales alcalinos.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:** Durante el manejo, mezcla, aplicación y lavado del equipo de aplicación, utilice equipo de protección completo: sombrero, gafas protectoras, mascarilla, overol, guantes y botas de hule. Lave el equipo de aplicación y protección después de cada jornada. No lave la ropa de protección junto con la ropa de uso normal. Evite el contacto directo con el producto y respirar la llovizna de aspersión.

**ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:** No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga este producto en contacto con otros agroquímicos, fertilizantes, semillas. Almacénelo bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION**  
**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.**

**BÁÑESE**

**DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.**



**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:**

Puede causar náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. Puede ocasionar irritación en los bronquios, tejido pulmonar y en la piel.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

**POR INGESTIÓN:** Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado dele clara de huevo en un poco de agua (8 para adultos y 4 para niños). Busque ayuda médica.

**POR CONTACTO CON LA PIEL:** Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Véase al médico.

**POR CONTACTO CON LOS OJOS:** Lávese éstos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Véase al médico.

**POR INHALACIÓN:** Traslade al paciente a un lugar no contaminado y manténgalo en reposo. Busque ayuda médica.

**ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO.**

Tratamiento sintomático y de sostén. No tiene antídoto.

**CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN**

**HOSPITAL DR. LUIS E. AYBAR  
TEL.684-3478/684-3672**

**HOSPITAL DR. FRANCISCO MOSCOSO PUELLO  
TEL.681-2913/681-6922**

**NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**



**TÓXICO PARA PECES**

**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.**

**MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:** Los envases vacíos destrúyalos luego de aplicarle el tratamiento del "Triple lavado", perfórelo y llévelos al centro de acopio más cercano de su

región. Si no es posible perfórelos y entiérrrelo lejos de aguas subterráneas.

**EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

**AVISO DE GARANTÍA:**

La compañía fabricante y el registrante, así como el distribuidor garantizan el contenido de este envase original bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. Garantizamos el contenido del producto de acuerdo a lo estipulado en la etiqueta y el uso recomendado en el panfleto. El consumidor adquiere el producto con pleno conocimiento de el

**FABRICADO Y FORMULADO POR:**

**Manufacturado por:** HEGANG TH-UNIS INSIGHT  
PESTICIDE CHEMISTRY CO LTD. ADD: No 58 HEYOU  
ROAD GONGNONG DISTRIC HENGANG CITY  
HEILONGJIAN CHINA.

**EXPORTADO POR:** SHENZHEN KING QUENSON  
INDUSTRY CO LTD DISTRICT SHENZHEN. PR CHINA

**DISTRIBUIDOR AUTORIZADO  
COMES SRL**

**Comercial Estévez**

**Av. Rivas con autopista Duarte Sector Jeremías,  
La Vega, Rep. Dom.**

**PAÍS No. DE REG. FECHA DE REG.**

**CHINA**

**REP. DOM. 4152 28-11-2012**

**NUMERO DE LOTE: \_\_\_\_\_**

**FECHA DE FORMULACIÓN: \_\_\_\_\_**

**FECHA DE VENCIMIENTO: \_\_\_\_\_**