

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.

CYPERKING 10 EC

INSECTICIDA- PIRETROIDE

CIPERMETRINA

Uso Veterinario



DAÑO

ANTÍDOTO: NO TIENE

DENSIDAD: 0.92 g/cm³ (20 °C)

SOLVENTE: XILENO

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICION.


NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACION. MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO:

MODO DE ACCION: Piretroide sintético con actividad insecticida, no sistémico, de amplio espectro, actúa por contacto e ingestión y posee efecto repelente .

EQUIPO DE APLICACIÓN: Se recomienda su aplicación en forma terrestre en un volumen de caldo de 200-400 litros de agua/ ha, ya sea con equipo manual (bombas de mochila) o con equipo impulsado por un tractor o en forma aérea con volumen de caldo 50-80 litros de mezcla. Utilice boquilla fina de cono. Antes y después de ser usados, el equipo de aplicación y los utensilios deben ser lavados cuidadosamente con agua y jabón.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua, agregue la dosis de aplicación y termine de llenar el tanque con agua. El equipo de aplicación y los utensilios usados en la mezcla del producto deben ser lavados después de cada jornada de trabajo, por lo menos tres veces. Mantenga en agitación constante la mezcla dentro del tanque. Prepare únicamente la cantidad de mezcla que puede ser aplicada durante el mismo día. Utilice equipo de protección personal durante el manejo y uso de este producto. Antes y después de ser usados, el equipo de aplicación y los utensilios deben ser lavados cuidadosamente con agua y jabón.



RECOMENDACIONES DE USO:

<p>Ácaros y Garrapatas: (controla adultos, larvas y ninfas de las garrapatas e inhibe fuertemente la ovoposición de las hembras adultas o teleoginas).</p>	<p>Boophilus microplus (garrapata común del bovino) Amblyomma cajennense Rhipicephalus sanguineus (garrapata del perro) Psoroptes spp. Sarcoptes scabiei Demodex spp.,Chorioptes spp. Notoedres cati</p>	<p>DOSIFICACIÓN</p> <p>Para baños de inmersión:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pie de baño: 0.8-1 cc/lit de agua dulce o salobre. - Reposición y refuerzo: 1.2-1.5 cc/lit de agua. - Refuerzo en seco: 0.5 cc/lit de agua.
<p>Moscas y tábanos</p>	<p>Musca spp. Haematobia irritans (mosca de los cuernos) Stomoxys calcitrans Liperosia irritans Callitroga hominivorax Sarcophaga carnaria Lucillia sericata Tabanus spp. Dermatobia hominis</p>	<p>Para aspersión de animales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Caninos: 1mlpor cada 1.25/lit de agua. <p>Resto de animales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0.8-1 cc/lit de agua <p>Para pulverización en locales e instalaciones:</p>
<p>Piojos</p>	<p>Damalinia bovis Damalinia ovis Bovicola subrostratus Haematopinus eurytarnus Linognathus vituli Haematopinus asini</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1 mL por cada 1.5 a 2.5 L de agua (proporción de 1 Lde la emulsión final cada 10 a 15 m de superficie a tratar). Para el correcto uso del producto hacer una 2 emulsión en un volumen de agua equivalente al doble de la cantidad del producto a utilizar. Para tratamientos estratégicos en zonas de saneamiento se recomienda su uso cada 21 días
<p>Pulgas</p>	<p>Ctenocephalides felis Ctenocephalides canis</p>	
<p>ESPECIES DE DESTINO</p>	<p>Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, camélidos, porcinos, caninos y aves.</p>	

INDICACIONES

Garrapaticida y ectoparasiticida contra pulgas, ácaros, piojos, moscas, entre otros. Su acción residual es de 3 a 4 semanas.

Puede usarse en baños por inmersión, aspersión o para fumigar por pulverización locales e instalaciones.

INTERVALO DE APLICACIÓN: Se aplica cuando aparece presencia de las plagas o de los daños ocasionados por éstas. También de forma preventiva.

INTERVALO DE REINGRESO DE PERSONAS Y ANIMALES DOMESTICOS AL ÁREA TRATADA:

24 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico si se siguen las instrucciones de dosis y uso dadas en el panfleto.

COMPATIBILIDAD:

Se recomienda no mezclar con otros productos, incluyendo surfactantes y adherentes.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Durante el manejo, mezcla, aplicación y lavado del equipo de aplicación, utilice equipo de protección completo: sombrero, gafas protectoras, mascarillas, overol, guantes y botas de hule. Lave el equipo de aplicación y protección después de cada jornada. No lave la ropa de protección junto con la ropa de uso normal. Evite el contacto directo con el producto y respirar la llovizna de aspersión.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga este producto en contacto con otros agroquímicos, fertilizantes, semillas. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION. MANTANGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACION DE ESTE PRODUCTO.

BÁÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SINTOMAS DE INTOXICACION:

Temblores, convulsiones, pupilas dilatadas, dolor de cabeza.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTION: Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, déle a beber clara de huevo con un poco de agua (8 para adultos, 4 para niños). Busque atención médica.

POR INHALACION: Retire a la persona de la zona contaminada y llévela a un lugar fresco y aireado, y colóquela en posición de descanso. Si aun tiene dificultad para respirar, practique respiración artificial mientras es llevado al médico.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lávelo con abundante agua durante por lo menos 15 minutos.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa contaminada y lave con suficiente agua limpia y jabón la parte contaminada.

NUNCA DE A BEBER, NI INDUZCA AL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: No tiene antídoto específico. Dar tratamiento sintomático y de sostén.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

HOSPITAL DR. LUIS E. AYBAR

TL.684-3478/684-3672

HOSPITAL DR. FRANCISCO MOSCOSO PUELLO TL.681-

2913/681-6922

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE:



TOXICO PARA PECES.

NO CONTAMINE RIOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS.



TOXICO PARA ABEJAS

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: Los envases vacíos deben pasar por el proceso de limpieza de "triple lavado", perfórelos y luego llévelos al centro de acopio aprobado por las autoridades más cercanas a su localidad. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.

EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTIA: El fabricante garantiza que las características físico-químicas de los ingredientes y sus cantidades corresponden a la formulación que se especifica en la etiqueta, siempre que el producto se encuentre en su envase original y sellado. El producto se garantiza por dos años como mínimo, después de la formulación.

FABRICANTE Y/O FORMULADOR:

YIXING XINGNONG CHEMICAL PRODUCTS CO., LTD
WASHI TOWN, YIXING CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA.

EXPORTADO POR:

SHENZHEN KING QUENSON INDUSTRY CO., LTD.
ROOM 1402, FLLOR 14, BLOCK A, FUTUREPLAZA,
QIAOCHENG BEILU, NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN,
CHINA

**IMPORTADO Y/O REGISTRADO POR
COMERCIAL ESTEVEZ S.R.L. (COMESA)
AVE. RIVAS CON AUTOPISTA DUARTE, JEREMIAS,
LA VEGA, R.D. TEL. 809-573-7709.**

PAIS No. REG. FECHA DE REG.

CHINA.

REP. DOM