

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y  
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS

# VAREJAO

## 25 WG

INSECTICIDA - NEONICOTENOIDE  
TIAMETOXAM



**ATENCIÓN**  
ANTÍDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE  
INHALA. PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS  
Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN  
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS,  
PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES  
DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



### USO AGRONÓMICO:

#### MODO DE ACCIÓN:

**VAREJAO 25 WG** Neonicotinoide de segunda generación, sistémico, con actividad insecticida por contacto e ingestión, para aplicar al suelo o en pulverización foliar. Penetra en el interior de la planta por las hojas cuando se aplica en pulverización foliar y por las raíces si se aporta mediante el riego por goteo; se distribuye con la savia por los órganos en crecimiento protegiendo los brotes, hojas y frutos.

#### EQUIPO DE APLICACIÓN:

Se recomienda su aplicación en forma terrestre en un volumen de caldo de 200-400 litros de agua/ha, ya sea con equipo manual (bombas de mochila) o con equipo impulsado por un tractor. Utilice boquilla fina de abanico. Puede ser aplicado vía aérea. Utilice el siguiente equipo de protección al manipular el producto, durante la preparación de la mezcla, carga y aplicación: guantes, botas de hule, mascarilla, sombrero, protector de ojos, pantalón y camisa de manga larga, delantal de material impermeable. Antes y después de ser usados, el equipo de aplicación y los utensilios deben ser lavados cuidadosamente con agua y jabón.



#### FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua, agregue la dosis recomendada del producto y agite; termine de llenar con agua limpia el tanque del equipo de aplicación y mantenga la agitación incluso durante la aplicación. Prepare únicamente la solución que pueda ser aplicada durante el mismo día.



### RECOMENDACIONES DE USO

Cultivos	Período Pre Cosecha (Días)	Dosis (g/ha)	
Arroz ( <i>Oryza sativa</i> )	30	Aplicación Foliar 150 a 300	Aplicación al Suelo 400 a 800
Tomate ( <i>Lycopersicon esculentum</i> )	3		
Pimiento ( <i>Capsicum annum</i> )	3		
Berenjena ( <i>Solanum melongena</i> )	3		
Melón ( <i>Cucumis melo</i> )	3		
Pepino ( <i>Cucumis sativus</i> )	3		
Papa ( <i>Solanum tuberosum</i> )	7		
Tabaco ( <i>Nicotiana tabacum</i> )	14		
Fresa ( <i>Fragaria vesca</i> )	14		
Lechuga ( <i>Lactuca sativa</i> )	21		
Repollo ( <i>Brassica oleracea var. Viridis</i> )	21		
Coliflor ( <i>Brassica oleracea var. Botrytis</i> )	21		
Brócoli ( <i>Brassica oleracea var. Italica</i> )	21		
Mango ( <i>Mangifera indica</i> )	21		
Lechosa ( <i>Carica papaya</i> )	21		
Uva ( <i>Vitis vinifera</i> )	21		
Cítricos ( <i>Citrus spp.</i> )	28		
Caña de Azúcar ( <i>Saccharum officinarum</i> )	30		

#### PLAGAS

Mosquita del Arroz (*Hidrellia spp.*), Sogata (*Tagosodes oryzicola*), Chinchas (*Nezara viridula*, *Tibraca spp.*, *Oebalus spp.*)

Afidos (*Aphis fabae*, *Myzus persicae*, *Brevicoryne brassicae*)

Mosca Blanca (*Bemisia tabaci*, *Trialeurodes spp.*)

Minadores (*Liriomyza spp.*, *Keifferia spp.*, *Phthorimaea operculella*)

Pulguilla de la Papa (*Epitrix spp.*)

Escama del Mango (*Ulacaspis tuberculari*, *Kilifia mangiferae*)

Escamas (*Coccus spp.*, *Pseudococcus spp.*, *Aonidiella aurantii*)

Cochinilla de la Lechosa (*Paracoccus marginatus*)

Diaforina (*Diaphorina citri*)

Minador de los Cítricos (*Phyllocnistis citrella*)

Salvazo (*Aenolamia sp.*)

#### INTERVALO DE APLICACION:

Aplicar al inicio de las infestaciones de las plagas y repetir si se considera necesario.

#### INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:

24 horas después de la última aplicación.

#### FITOTOXICIDAD:

VAREJAO 25 WG no es fitotóxico si siguen las instrucciones de uso dada en el panfleto.

#### COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de plaguicidas a excepción con los de reacción alcalina. Sin embargo se recomienda hacer una prueba de compatibilidad previa.

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

### ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga este producto en contacto junto con otros agroquímicos, fertilizantes, semillas. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado alejado del calor. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.**



**BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.**

### SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

No se conocen síntomas de intoxicación.

### PRIMEROS AUXILIOS:

**EN CASO DE INGESTIÓN:** NO INDUZCA AL VÓMITO. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**EN CASO DE INHALACIÓN:** mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA AL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

### ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

NO EXISTE ANTÍDOTO ESPECÍFICO. Dar tratamiento sintomático y de sostén.

### CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN

Institución	Teléfonos
Hospital Luis Eduardo Aybar	809-684-3478 Extensión 672
Hospital Moscoso Puello	809-681-2913 / 809-681-6922

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

### TÓXICO PARA PECES



### TÓXICO PARA ABEJAS



**RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.**

**NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.**

**ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.**

### MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Los envases vacíos perforéelos o destrúyalos y luego deben ser llevados al centro de acopio más cercano. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en desechos de fuentes de agua, estos deben ser alejados de ellas y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.

**EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

### AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante y el distribuidor garantizan que las características fisicoquímicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta. El uso y manejo del mismo está fuera de su control y responsabilidad, por lo que el comprador asume todo riesgo que se derive del uso de este producto.

#### Fabricante & Exportador:

AGROWALLIED VENTURES PVT. LTD.  
RIICO Industrial Area, Keshwana, Kotputli, Jaipur, Rajasthan India - 380051

#### Importado y/o Registrado por:

COMERCIAL ESTÉVEZ, S.R.L.  
Avenida Rivas casi esquina Autopista Duarte, Jeremías, La Vega, República Dominicana  
809 573 7709 | info@comesa.com.do | www.comesa.com.do | @comesard

País	Número de Registro	Fecha de Registro
China		
República Dominicana	5839	22/11/2017